

Инструкция по Применению

Безрецептурный ветеринарный препарат наружного применения


[Общее название] Полоски флуметрина

[Название товара] Apiflume

[Основной компонент] Флуметрин

[Молекулярная формула] $C_{28}H_{22}Cl_2FNO_3$

[Химическая структурная формула]



[Свойства] данный продукт представляет собой пластины от желтого до оранжевого цвета со слабым характерным специфическим запахом.

[Фармакологическое действие]

Данный препарат воздействует на нервную систему вредителей, нарушая функцию нервной системы под действием натриевых каналов. Данный продукт относится к пиретроидным пестицидам. В основном используется для борьбы с эктопаразитами пчел, птиц и скота, подавляет активность яйцекладки взрослых особей и выведения из яичек.

[Взаимодействие фармацевтических препаратов] Данный продукт не должен использоваться совместно с пестицидами и щелочными препаратами, во избежании неактивности препарата.

[Роль и назначение] Пестицид, предназначен для лечения и профилактики клеща Varroa.

[Способ применения и дозы]

1. Способ применения препаратов: подвесить препараты по диагонали между двумя сотами над летком. Для пчелосемьи до 4 рамок, применяйте 1/3~1/2 пластина; для пчелосемьи на 4~8 рамок – 1/2~2/3 пластина; для пчелосемьи расположенных на 9 рамках и выше – 2/3~1 пластины. Рекомендуется заменить или добавить 1 пластину через 5~7 дней. Курс лечения включает 3~4 цикла
2. До применения препарата на всей пасеке, необходимо опробовать его на 2~3 пчелиных семьях, и наблюдать

опробование в течение 24~48 часов, чтобы определить конкретный вариант применения препарата. Желательно

провести испытания препарата в солнечные дни, чтобы облегчить наблюдение за состоянием семей, впоследствии отрегулировать дозу препарата в зависимости от результатов испытания. Следует увеличить или уменьшить количество и частоту применения препарата в случае роения, для ульев с малым количеством рамок или сильным поражением клещом Varroa.

[Противопоказания] Данный препарат не оказывает явного негативного воздействия на здоровые пчелосемьи. Применение данного препарата может вызвать заболевание пчел - ползание для роев с низкой естественной толерантности к препаратам (например, пчелы-листорезы) или нездоровых пчел, по причине разности в толерантности к препаратам на разных стадиях развития. Следует наблюдать за пчелами в течение нескольких часов после применения препарата, и принять необходимые меры.

[Меры предосторожности]

1. При обнаружении слипания или намокания пластин препарата во время распаковки. Просушить в прохладном месте в течение 24~48 часов, до состояния когда они не прилипают к пальцам, иначе они навредят пчелам. не оставляйте их в солнечном месте, иначе эффективность препарата значительно снизится.
2. Не применять данный препарат при температуре окружающей среды выше 35°C или ниже 15°C, в случае недостатка кормовой базы у пчел, их переселения, в начальный период их поселения или в других ненормальных случаях.
3. Данный препарат не допускается для пчелосемей, которые находятся в периоде взятка чаных цветков, или недавно были накормлены пыльцой чайных цветков или другими щелочными препаратами или продуктами.
4. Время непрерывного применения препарата в улье должно быть не более 6 недель.
5. Во время установки пластин препарата следует надеть защитные перчатки, маску; не курить, не принимать в рот пищу или воду; после окончания работы, вымойте руки.
6. Отработанные пластины не должны использоваться повторно и подлежат централизованному уничтожению.
7. Пластины препарата не должны соприкасаться со пищевым медом и не должны храниться с пестицидами или другими химикатами.
8. Следует сохранить данный препарат вдали от пищевых продуктов и в недоступном для детей месте. Откройте их только перед применением.
6. Запрещается применять данный препарат в период медосбора.

[Период отмены препарата] Не требуется установить

[Упаковка] 3.6 мг / полоска

[Условия хранения] в закрытом, прохладном и сухом помещении

[Срок действия] 4 года

[Производитель] Sichuan Lingman Biotechnology Co., Ltd.

[Адрес компании] КНР, провинция Сычуань, г. Мэйшань, новая зона экономического развития, ул. Юйгуй, №10



БАЗОВЫЕ ПОЛОСКИ APIBUZZ ДЛЯ БОРЬБЫ С КЛЕЩАМИ У ПЧЁЛ

.Безвреден для пчел

Лучшая стабильность

Высокая эффективность

Удобно использовать

низкий остаточный





ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Название продукта ----- Апифлува полоски варроа
Бренд ----- Apibuzz
Размер упаковки ----- 20 полосок/пакет
Размер полоски ----- 21 см x 3 см
Активное содержимое ----- Тау-флувалинат
Эффективность ----- Для базовой профилактики
и лечения пчелиного клеща. Не наносит вреда медоносным пчелам
Срок годности ----- 4 года
Советы ----- Не использовать в период медосбора




Для 10-рамочного улья нанесите 1~2 полоски. Нанесите полоски еще раз через 5~7 дней. Курс лечения составляет .3~4 раза

ТРЕБУЕТСЯ ПРОБНЫЙ ПЕРИОД

Выберите 3 или 5 пчелиных семей для испытания, прежде чем применять ко всей колонии. Сделайте специальные полоски, используя план после наблюдения за испытанием в течение 24–48 часов. Лучше проводить испытание в солнечный день и корректировать дозу в соответствии с фактической ситуацией. Увеличивайте или уменьшайте дозу или время применения при условии, что есть ступенчатые ульи, меньше сотовых рамок или серьезные клещи Варроа на .пчелах



ШАГ 1



ШАГ 2