

## Инструкция по Применению

Безрецептурный ветеринарный препарат наружного применения


**[Общее название]** Полоски флувалината

**[Название товара]** Apifluva

**[Основной компонент]** Тау-Флувалинат

**[Молекулярная формула]** C<sub>26</sub>H<sub>22</sub>ClF<sub>3</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

**[Химическая структурная формула]**



**[Свойства]** данный продукт представляет собой пластины от желтого до оранжевого цвета со слабым характерным специфическим запахом.

**[Фармакологическое действие]** Данный препарат действует контактным способом и желудочным отравлением, не летучий. Тау-флувалинат может действовать на нервную систему пчелиных клещей, изменяя проницаемость их синаптической мембраны к действию ионов через особые рецепторы или путем растворения в мембране и избирательно воздействуя на натриевые каналы в мембране, что приводит к задержке клапанов каналов в закрытии и непрерывному течению Na<sup>+</sup> внутрь, впоследствии к повышенному возбуждению, спазму и последующей смерти клещей из-за паралича. Действие препарата начинается через 30 мин после применения. Использование препарата в без расплодный период позволяет окончательно уточнить все вредителей в течении 21-28 дней. При этом, он является препаратом длительного действия. В период расплода необходимо продлить период применения препарата.

**[Взаимодействие фармацевтических препаратов]** Данный продукт не должен использоваться совместно с пестицидами и щелочными препаратами во избежании неактивности препарата.

**[Роль и назначение]** Пестицид, предназначен для уничтожения и профилактики клеща Varroa.

**[Способ применения и дозы]**

1. Способ применения препарата: подвесить полоски по диагонали между двумя сотами над летком. Для пчелиной семьи до 4 рамок, применяйте 1/2~1 пластины; для пчелиной семьи расположенных на 4~8 рамок - 1 пластина; для пчелиной семьи расположенных на 9 рамках и больше – 1~2 пластины. Рекомендуется заменить или добавить 1 пластину через 5~7 дней. Курс лечения включает 3~4 цикла.

2. До применения препарата на всей пасеке, необходимо опробовать его на 2~3 пчелиных семьях, и наблюдать опробование в течение 24~48 часов, чтобы определить конкретный вариант применения препарата. Желательно

провести испытания препарата в солнечные дни, чтобы облегчить наблюдение за состоянием семей, впоследствии отрегулировать дозу препарата в зависимости от результатов испытания. Следует увеличить или уменьшить количество и частоту применения препарата в случае роения, для ульев с малым количеством рамок или сильным поражением клещем Varroa.

**[Противопоказания]** Данный препарат не оказывает явного негативного воздействия на здоровые пчелосемьи. Применение данного препарата может вызвать заболевание пчел – ползание пчел для семей с низкой естественной толерантностью к препаратам (например, пчелы-листорезы) или нездоровых пчел, по причине разности в толерантности к препаратам на разных стадиях развития. Следует наблюдать за пчелами в течение нескольких часов после применения препарата, и принять необходимые меры.

#### **[Меры предосторожности]**

1. При обнаружении слипания или намокания пластин препарата во время распаковки. Просушить в прохладном месте в течение 24~48 часов, до состояния когда они не прилипают к пальцам, иначе они навредят пчелам. не оставляйте их в солнечном месте, иначе эффективность препарата значительно снизится.
2. Не применять данный препарат при температуре окружающей среды выше 35°C или ниже 15°C, в случае недостатка кормовой базы у пчел, их переселения, в начальный период их поселения или в других ненормальных случаях.
3. Данный препарат не допускается для пчелосемей, которые находятся в периоде взятка чаных цветков, или недавно были накормлены пыльцой чайных цветов или другими щелочными препаратами или продуктами.
4. Время непрерывного применения препарата в улье должно быть не более 6 недель.
5. Во время установки пластин препарата следует надеть защитные перчатки, маску; не курить, не принимать в рот пищу или воду; после окончания работы, вымойте руки.
6. Отработанные пластины не должны использоваться повторно и подлежат централизованному уничтожению.
7. Пластины препарата не должны соприкасаться со пищевым медом и не должны храниться с пестицидами или другими химикатами.
8. Следует сохранить данный препарат вдали от пищевых продуктов и в недоступном для детей месте. Откройте их только перед применением.
6. Запрещается применять данный препарат в период медосбора.

**[Период отмены препарата]** Не требуется установить

**[Упаковка]** 40 мг / полоска

**[Условия хранения]** в закрытом, прохладном и сухом помещении

**[Срок действия]** 4 года

**[Производитель]** Sichuan Lingman Biotechnology Co., Ltd.

[Адрес компании] КНР, провинция Сычуань, г. Мэйшань, новая зона экономического развития, ул. Юйгуй, №10

[Компания торговая] Chengdu Flybee Trading Co., Ltd.

[Веб-сайт] [www.fly-bee.com](http://www.fly-bee.com)

[Email] [sales\\_02@fly-bee.com](mailto:sales_02@fly-bee.com)

[Mob & Wechat & WhatsApp] +86-130 8806 0987



## БАЗОВЫЕ ПОЛОСКИ АРИБУЗЗ ДЛЯ БОРЬБЫ С КЛЕЩАМИ У ПЧЁЛ

Безвреден для пчелы

Лучшая стабильность

Высокая эффективность

Удобно использовать

низкий остаточный





ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Название продукта ----- Апифлува полоски варроа  
Бренд ----- Apibuzz  
Размер упаковки ----- 20 полосок/пакет  
Размер полоски ----- 21 см x 3 см  
Активное содержимое ----- Тау-флувалинат  
Эффективность ----- Для базовой профилактики  
и лечения пчелиного клеща. Не наносит вреда медоносным пчелам  
Срок годности ----- 4 года  
.Советы ----- Не использовать в период медосбора


Внутренняя сумка



Для 10-рамочного улья нанесите 1~2 полоски. Нанесите полоски еще раз через 5~7 дней. Курс лечения составляет .3~4 раза

### ТРЕБУЕТСЯ ПРОБНЫЙ ПЕРИОД

Выберите 3 или 5 пчелиных семей для испытания, прежде чем применять ко всей колонии. Сделайте специальные полоски, используя план после наблюдения за испытанием в течение 24–48 часов. Лучше проводить испытание в солнечный день и корректировать дозу в соответствии с фактической ситуацией. Увеличивайте или уменьшайте дозу или время применения при условии, что есть ступенчатые ульи, меньше сотовых рамок или серьезные клещи Варроа на .пчелах



ШАГ 1



ШАГ 2